

# د اطفالو لپاره د واکسينونو ترسره کول

## د والدينو لپاره يو لارښود

دا هغه واکسينونه دي چې ستاسو اطفال ورته اړتيا لري!

| د زېږون<br>پرمهال <sup>1,2</sup>        | تور زېږی                                                                                                                                                                                                                                                       | RSV-mAb <sup>1</sup><br>0-7 مياشتې |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2 مياشتنۍ <sup>1,2</sup>                | تور زېږی <sup>2</sup> + DTaP + PCV + Hib + پوليو + RV                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 4 مياشتنۍ <sup>1,2</sup>                | تور زېږی <sup>3</sup> + DTaP + PCV + Hib + پوليو + RV                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 6 مياشتنۍ <sup>1,2</sup>                | تور زېږی <sup>2</sup> + DTaP + PCV + Hib <sup>4</sup> + پوليو <sup>2</sup> + RV <sup>5</sup> + انفلوینزا <sup>6</sup> + کووید <sup>7</sup>                                                                                                                     |                                    |
| 12 مياشتنۍ<br>او ډېر عمر <sup>1,2</sup> | MMR <sup>2</sup> + DTaP <sup>2</sup> 15-18 + PCV <sup>2</sup> 12-15 مياشتې <sup>2</sup> + Hib <sup>2</sup> 12-15 مياشتې <sup>2</sup> + ميانه <sup>2</sup> 12-15 مياشتې <sup>2</sup> + ژېړ زېږی <sup>8</sup> 12-23 مياشتې <sup>2</sup> + انفلوینزا <sup>6</sup> |                                    |

له خپل ډاکټر يا نرس سره وگورئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو ماشوم ټول واکسينونه په خپل وخت ترلاسه کوي. ډيری وختونه واکسين گډ او په ترکيبي بڼه کېږي ترڅو د ستونو شمېر راکم شي. د خپل ماشوم د واکسينو کارت غوښتنه هرو مرو وکړئ چې د شوي واکسينونو نېټې پکې ليکل شوي وي؛ دا هر ملاقات ته د ځان سره راوړئ.

دلته د ناروغيو يو ليست دی چې د واکسينو په پايله کې به يې پروړاندې ستاسو ماشوم خوندي وي:

**RSV:** د تنفسي سنسيشيال ويروس، د سږو شديد عفويت

**RV:** د روټاويروس عفونيت، د شديد نس ناستي ناروغي

**انفلوینزا:** د سږو شديد ناروغي

**MMR:** شری، ممپس، او روبیلا

**کووید 19:** شديد او خورا ډېره عفوني ناروغي

**ژېړ زېږی:** هېپاټايتس ای، د خيگر شديد ناروغي

**شری:** وارسېلا هم ورته ويل کېږي

**تور زېږی:** تور زېږی، د خيگر جدي ناروغي

**DTaP:** ديفټيريا، تيتانوس (د جامې کلکېدل)، او پيرټوسس (تور ټوخی)

**PCV:** د سينه بغل واکسين د وينې، سږو، او د مغز شديد عفونيت پر وړاندې خونديتوب وړاندې کوي

**Hib:** هاپموفيلس انفلوینزا نوع بي، د مغز، ستوني، او د وينې شديد عفونيت

**پوليو:** پوليو يا گوزن، د شديد گوزن ناروغي

### د پورتنی جدول په اړه يادښتونه:

- د اکتوبر څخه تر مارچ پورې، اطفال د زېږون له عمر څخه تر 7 مياشتنۍ پورې ښايي د RSV وقايوي انټي باډي (RSV-mAb) ته اړتيا ولري که چېرې د RSV واکسين د امېندواری پرمهال ترسره شوي نه وي. ځينې عمر لرونکي اطفال د 8 مياشتنۍ څخه تر 19 مياشتنۍ پورې ښايي RSV-mAb ته د هغوی د دوهم RSV موسم پرمهال اړتيا ولري.
- دا د عمر هغه حد دی چې دا واکسين بايد پکې وشي.
- ستاسو ماشوم ښايي د کارول شويو واکسين په پام کې نيولو سره، په 4 مياشتنۍ عمر کې د تور زېږي د واکسين يوه دوز ته اړتيا ونه لري. له خپل ډاکټر يا نرس سره وگورئ.
- ستاسو ماشوم ښايي د کارول شوي واکسينو په پام کې نيولو سره، په 6 مياشتنۍ عمر کې د Hib واکسين يو دوز ته اړتيا ونه لري. له خپل ډاکټر يا نرس سره وگورئ.
- ستاسو ماشوم ممکن د کارول شوي واکسين په پام کې نيولو سره، په 6 مياشتنۍ عمر کې د RV واکسين يو دوز ته اړتيا ونلري. له خپل ډاکټر يا نرس سره وگورئ.
- د 6 مياشتو او ډېر عمر لرونکي ټول ماشومان بايد د هر کال مني يا ژمي کې د انفلوینزا پروړاندې واکسين شي.
- د ورکول کېدونکي کووید 19 واکسين براند په پام کې نيولو سره، ستاسو ماشوم به 2 يا 3 دوزونو ته اړتيا ولري.
- ستاسو ماشوم به د ژېړ زېږي واکسين 2 دوزونو ته اړتيا ولري، چې لږترلږه د 6 مياشتو مهالني واټن په توپير سره ورکول کېږي.

