

Иммунизация младенцев

Руководство для родителей

Ниже перечислены вакцины, необходимые вашему ребенку!

При рождении ^{1,2}	НерВ мАТ к РСВ ¹ 0–7 мес.														
2 месяца ^{1,2}	НерВ 1–2 мес. ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Polio	+	RV				
4 месяца ^{1,2}	НерВ ³	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Polio	+	RV				
6 месяцев ^{1,2}	НерВ 6–18 мес. ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib ⁴	+	Polio 6–18 мес. ²	+	RV ⁵	+	Грипп ⁶	+	COVID ⁷
12 месяцев и старше ^{1,2}	MMR 12–15 мес. ²	+	DTaP 15–18 мес. ²	+	PCV 12–15 мес. ²	+	Hib 12–15 мес. ²	+	Chickenpox 12–15 мес. ²	+	НерА ⁸ 12–23 мес. ²	+	Грипп ⁶		

Проконсультируйтесь со своим врачом или медсестрой и убедитесь, что ваш ребенок получает все прививки по графику. Многие вакцины объединены вместе, чтобы сократить количество инъекций. Не забудьте попросить карту с датами вакцинации вашего ребенка. Берите ее с собой при каждом посещении врача.

Ниже приведен список заболеваний, от которых будет защищен ваш ребенок:

НерВ: гепатит В, серьезное заболевание печени.

DTaP: дифтерия, столбняк (спазм жевательных мышц) и коклюш (судорожный кашель).

PCV: единая вакцина для профилактики пневмококковых инфекций, защищает от серьезной инфекции крови, легких и головного мозга.

Hib: *Haemophilus influenzae (гемофильный грипп)* типа В, серьезная инфекция головного мозга, горла и крови.

Polio: полиомиелит, серьезное парализующее заболевание.

РСВ: респираторно-синцитиальный вирус, серьезная легочная инфекция.

RV: ротавирусная инфекция, серьезное заболевание, вызывающее сильную диарею.

Грипп: серьезная инфекция легких.

MMR: корь, паротит и краснуха.

COVID-19: серьезное и очень заразное заболевание.

НерА: гепатит А, серьезное заболевание печени.

Chickenpox: ветряная оспа, также называется ветрянкой.

Примечания к таблице выше:

- С октября по март младенцам в возрасте от рождения до 7 месяцев может потребоваться введение профилактических антител к РСВ (МАТ к РСВ), если вакцина против РСВ не вводилась во время беременности. Некоторым более старшим младенцам в возрасте от 8 до 19 месяцев может потребоваться применение МАТ к РСВ во время второго сезона РСВ.
- В таблице указан возрастной диапазон, в котором следует вводить вакцину.
- В зависимости от используемой вакцины, в возрасте 4 месяцев вашему ребенку может и не потребоваться прививка от Нер В. Спросите об этом своего врача или медсестру.
- В зависимости от используемой вакцины, в возрасте 6 месяцев вашему ребенку может и не потребоваться доза вакцины Hib. Спросите об этом своего врача или медсестру.
- В зависимости от используемой вакцины, в возрасте 6 месяцев вашему ребенку может и не потребоваться доза вакцины RV. Спросите об этом своего врача или медсестру.
- Все дети в возрасте 6 месяцев и старше должны проходить вакцинацию против гриппа осенью или зимой каждого года.
- Вашему ребенку потребуется 2 или 3 дозы, в зависимости от марки вакцины против COVID-19.
- Вашему ребенку потребуется 2 дозы вакцины против Нер А с интервалом не менее 6 месяцев.

