

Inmunizaciones para bebés

Guía para padres

¡Estas son las vacunas que necesita su bebé!

Al nacer ^{1,2}	HepB	VRS-AcM ¹ 0-7 meses													
2 meses ^{1,2}	HepB 1-2 meses ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Poliomielitis	+	RV				
4 meses ^{1,2}	HepB ³	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Poliomielitis	+	RV				
6 meses ^{1,2}	HepB 6-18 meses ²	+	DTaP	+	PCV	+	Hib ⁴	+	Poliomielitis 6-18 meses ²	+	RV ⁵	+	Gripe ⁶	+	COVID ⁷
12 meses o más ^{1,2}	MMR 12-15 meses ²	+	DTaP 15-18 meses ²	+	PCV 12-15 meses ²	+	Hib 12-15 meses ²	+	Varicela 12-15 meses ²	+	HepA ⁸ 12-23 meses ²	+	Gripe ⁶		

Consulte a su médico o personal de enfermería para asegurarse de que su bebé recibe todas las vacunas según lo programado. Muchas veces se combinan vacunas para reducir el número de inyecciones. Asegúrese de pedir una tarjeta de registro con las fechas de las vacunas de su bebé; tráigala a cada visita.

Esta es una lista de las enfermedades contra las que su bebé estará protegido:

HepB: hepatitis B, una enfermedad hepática grave

DTaP: difteria, tétanos (trismo) y tosferina (tos convulsa)

PCV: vacuna antineumocócica conjugada que protege contra una infección grave de la sangre, los pulmones y el cerebro

Hib: *Haemophilus influenzae* tipo b, una infección grave del cerebro, la garganta y la sangre

Poliomielitis: poliomielitis, una enfermedad paralizante grave

VRS: virus respiratorio sincitial, una infección pulmonar grave

RV: infección por rotavirus, una diarrea grave

Gripe: infección pulmonar grave

MMR: sarampión, paperas, rubéola

COVID-19: una enfermedad grave y muy infecciosa

HepA: hepatitis A, una enfermedad hepática grave

Varicela: también llamada lechina

Notas del gráfico anterior:

1. De octubre a marzo, los lactantes desde el nacimiento hasta los 7 meses de edad pueden necesitar anticuerpos preventivos contra el VRS (VRS-AcM) si no se administró la vacuna contra el VRS durante el embarazo. Algunos niños entre los 8 y 19 meses de edad pueden necesitar VRS-AcM durante su segunda temporada de VRS.
2. Este es el intervalo de edad en el que se debe administrar esta vacuna.
3. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna Hep B a los 4 meses de edad, dependiendo de la vacuna utilizada. Consulte a su médico o enfermero.
4. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna Hib a los 6 meses de edad, dependiendo de la vacuna utilizada. Consulte a su médico o enfermero.
5. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna RV a los 6 meses de edad, dependiendo de la vacuna utilizada. Consulte a su médico o enfermero.
6. Todos los niños de 6 meses de edad y mayores deben vacunarse contra la gripe en otoño o invierno cada año.
7. Su hijo necesitará 2 o 3 dosis, dependiendo de la marca de la vacuna contra el COVID-19 administrada.
8. Su hijo necesitará 2 dosis de la vacuna HepA, administradas con al menos 6 meses de diferencia.

