

متى يحتاج الأطفال والمراهقون إلى التطعيمات؟

العمر	HepB التهاب الكبد B الوائي	RSV- mAb	DTaP/Tdap الدفتيريا والتيفانوس والشاهوق (السعال الديكي)	Hib المستدمية النزلية من النوع b	IPV شلل الأطفال	PCV المكورات الرئوية المتقارن	RV الفيروسات العنكبوتية	MMR الحصبة والكاف والحصبة الألمانية	الحماق الجدري المائي	HepA التهاب الكبد الوبائي A	كوفيد-19	حمى الضنك	HPV فيروس الورم الحليمي البشري	MenB Men- ACWY المكورات السحائية	الإنفلونزا Flu
عند الولادة	✓	✓ ² (7-0 شهور)													
شهران	✓		✓	✓	✓	✓	✓								
4 شهور	✓ ¹		✓	✓	✓	✓	✓								
6 شهور	✓ (18-6 شهور)		✓	✓ ¹	✓ (18-6 شهور)	✓	✓ ¹								✓
8 شهور															
12 شهرًا		✓ ² (19-8 شهور)	✓ ³ (18-15 شهور)	✓ (15-12 شهور)		✓ (15-12 شهور)		✓ (15-12 شهور)	✓ (15-12 شهور)	✓✓ (جرعتان يتم إعطاؤهما يفصل بينهما مدة 6 أشهر بشكل روتيني في عمر من 12 إلى 23 شهرًا)					
15 شهرًا															
18 شهرًا															
23-19 شهرًا															
4-6 سنوات			✓ (Tdap)		✓			✓	✓	✓ (جرعتان) لقاح للأطفال والمراهقين الذين لم يسبق لهم الحصول على اللقاح	✓ ⁴ يُوصى بإعطاء لقاح كوفيد-19 لكل شخص في عمر 6 شهور فأكثر				
7-10 سنوات															
11-12 سنة													✓✓✓✓ ⁵ يُوصى بلقاح حمى الضنك لبعض الأطفال	✓✓ ^{6,7}	
13-15 سنة															
16-18 سنة														✓✓ ^{8,9,10}	

(6 شهور وأكبر)

جرعة واحدة كل خريف أو
شتاء. يحتاج بعض الأطفال
الأصغر من 9 سنوات إلى
جرعتين: أسأل مقدم الرعاية
الصحية لطفلك عما إذا كان طفلك
يحتاج إلى أكثر من جرعة واحدة.

يُوصى بلقاح
الإنفلونزا
كل عام لكل شخص
عمره 6 شهور
فأكبر

ملاحظات

- قد لا يحتاج طفلك هذه الجرعة بناءً على العلامة التجارية للقاح الذي يستخدمه مقدم الرعاية الصحية.
- يجب أن يحصل الرضيع الذين لم تحصل أمهاتهم على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) أثناء الحمل والذين تقل أعمارهم عن 8 أشهر و0 يومًا على الأجسام المضادة الوقائية للفيروس المخلوي التنفسي (RSV-mAb) قبل موسم الفيروس المخلوي التنفسي أو خلاله (عادةً من أكتوبر إلى مارس). يحتاج بعض الأطفال المعرضين لخطر مرتفع (من 8 إلى 19 شهرًا) إلى RSV-mAb قبل موسم RSV الثاني.
- يمكن إعطاء جرعة DTaP هذه ميكروًا عند عمر 12 شهرًا إذا مضت 6 شهور على الجرعة السابقة.
- يحتاج الأطفال بعمر 5 سنوات أو أكبر عمومًا إلى جرعة واحدة فقط. يتم تحديد عدد الجرعات للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 4 سنوات حسب العلامة التجارية للقاح.
- يُوصى بإعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا و يعيشون في بورتوريكو، وساموا الأمريكية، وجزر العذراء الأمريكية، وولايات ميكرونيزيا المتحدة، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، والذين تأكد مختبريًا إصابتهم سابقًا بحمى الضنك سلسلة مكونة من 3 جرعات من لقاح حمى الضنك.
- لقاح HPV روتيني في سن 11 أو 12 عامًا، لكن يمكن أن يبدأ في سن 9 سنوات.
- سيحتاج الأطفال الذين يعانون من حالات طبية مُعَيَّنة إلى جرعة ثالثة.
- يمكن إعطاء هذا اللقاح للمراهقين الأصحاء. يُوصى به أيضًا للمراهقين الذين يعانون من حالات صحية مُعَيَّنة.
- قد يحتاج المراهق أيضًا إلى جرعة إضافية بناءً على توصية مقدم الرعاية الصحية.
- عند الحاجة إلى لقاحي MenB وMenACWY، يمكن استخدام لقاح MenABCWY المتقارن.

