

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VACINA

Vacina do rotavírus: *O que você precisa saber*

Many vaccine information statements are available in Portuguese and other languages. See www.immunize.org/vis

Muitas declarações de informações sobre vacinas estão disponíveis em português e outros idiomas. Consulte www.immunize.org/vis

1. Por que se vacinar?

A vacina do rotavírus pode prevenir a doença do rotavírus.

O rotavírus geralmente causa diarreia severa e aquosa, principalmente em bebês e crianças pequenas. O vômito e a febre também são comuns em bebês com rotavírus. As crianças podem ficar desidratadas e precisam ser hospitalizadas e podem até mesmo morrer.

2. Vacina do rotavírus

A vacina contra rotavírus é administrada colocando gotas na boca da criança. Os bebês devem receber 2 ou 3 doses de vacina contra rotavírus, dependendo da marca de vacina utilizada.

- A primeira dose deve ser administrada antes das 15 semanas de idade.
- A última dose deve ser administrada até os 8 meses de idade.

Quase todos os bebês que receberem a vacina contra rotavírus serão protegidos contra diarreia severa por rotavírus.

Outro vírus chamado “circovírus suíno” pode ser encontrado em uma marca de vacina contra o rotavírus (Rotarix). Esse vírus não infecta pessoas e não há risco de segurança conhecido.

A vacina contra o rotavírus pode ser administrada ao mesmo tempo que outras vacinas.

3. Converse com seu profissional de saúde

Diga ao seu profissional de saúde se a pessoa que receber a vacina:

- Teve uma **reação alérgica após uma dose anterior de vacina contra o rotavírus** ou teve alguma **alergia grave, com risco à vida**
- Tem um **sistema imunológico debilitado**

Rotavirus VIS - Portuguese (10/15/21)

- Tem **imunodeficiência combinada severa (SCID)**
- Teve um tipo de bloqueio intestinal chamado “**intussuscepção**”

Em alguns casos, o profissional de saúde de seu filho pode decidir adiar a vacinação contra o rotavírus até uma visita futura.

Os bebês com doenças menores, como uma gripe, podem ser vacinados. Os bebês com doenças moderadas ou graves normalmente devem aguardar até que se recuperem antes de receber a vacina contra o rotavírus.

O profissional de saúde do seu filho poderá fornecer mais informações.

4. Riscos de uma reação à vacina

- Irritabilidade ou diarreia leve, temporária ou vômito podem ocorrer após a vacina contra o rotavírus.

Intussuscepção é um tipo de bloqueio intestinal que é tratado em um hospital e pode requerer cirurgia. Acontece naturalmente em algumas crianças todos os anos nos Estados Unidos, e geralmente não há nenhuma razão conhecida para isso. Há também um pequeno risco de intussuscepção da vacinação contra o rotavírus, geralmente dentro de uma semana após a primeira ou segunda dose da vacina. Esse risco adicional é estimado em cerca de 1 em cada 20.000 bebês americanos a 1 em cada 100.000 bebês americanos que recebem a vacina contra o rotavírus. Seu profissional de saúde pode fornecer mais informações.

Assim como com qualquer medicamento, existe uma chance muito remota de uma vacina causar reação alérgica grave, outros ferimentos graves ou morte.



**U.S. Department of
Health and Human Services**
Centers for Disease
Control and Prevention

5. E se houver um problema grave?

Para intussuscepção, procure por sinais de dor de estômago junto com choro severo. No início, esses episódios podem durar apenas alguns minutos e ir e vir várias vezes em uma hora. Os bebês podem puxar suas pernas até o peito. Seu bebê também pode vomitar várias vezes ou ter sangue nas fezes, ou pode parecer fraco ou muito irritado. Esses sinais normalmente acontecem durante a primeira semana após a primeira ou segunda dose da vacina contra o rotavírus, mas procure por eles a qualquer momento após a vacinação. Se você acha que seu bebê tem intussuscepção, entre em contato imediatamente com um profissional de saúde. Se você não conseguir falar com seu profissional de saúde, leve seu bebê a um hospital. Diga-lhes quando seu bebê recebeu a vacina contra o rotavírus.

Uma reação alérgica pode ocorrer após a pessoa vacinada sair da clínica. Se você perceber sinais de uma reação alérgica grave (urticária, inchaço do rosto e garganta, dificuldade para respirar, batimento cardíaco acelerado, tontura ou fraqueza), ligue para **9-1-1** e leve a pessoa ao hospital mais próximo.

Para outros sinais que o preocupam, ligue para seu profissional de saúde.

Reações adversas devem ser relatadas ao Sistema de Relatórios de Eventos Adversos de Vacinas (VAERS). Seu profissional de saúde normalmente preencherá este relatório ou você mesmo pode fazê-lo. Visite o site do VAERS em www.vaers.hhs.gov ou ligue para **1-800-822-7967**. *O VAERS serve apenas para relatar reações, e membros da equipe VAERS não fornecem orientações médicas.*

6. O Programa Nacional de Compensação por Lesões por Vacinas

O Programa Nacional de Compensação por Lesões por Vacinas (VICP) é um programa federal que foi criado para compensar pessoas que podem ter sido lesionadas por certas vacinas. Alegações de supostas lesões ou morte devido à vacinação têm um limite de tempo para serem encaminhadas, o que pode ser no máximo dois anos. Visite o site do VICP em www.hrsa.gov/vaccinecompensation ou ligue para **1-800-338-2382** para saber mais sobre o programa e como encaminhar uma alegação.

7. Como posso saber mais?

- Pergunte ao seu profissional de saúde.
- Ligue para o seu departamento de saúde local ou estadual.
- Visite o site da Food and Drug Administration (FDA) para as bulas das vacinas e mais informações em www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines.
- Entre em contato com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC):
 - Ligue para **1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO)** ou
 - Visite o site do CDC em www.cdc.gov/vaccines.

