

ویکسین سے متعلق معلومات کا بیان

Many Vaccine Information Statements are available in Urdu and other languages. See www.immunize.org/vis

ٹیکے کی معلومات کے بہت سارے بیانات اردو اور دوسری زبانوں میں دستیاب ہیں۔ www.immunize.org/vis کریں ملاحظہ

ہیمو فیلز انفلوئنزا ٹائپ بی (Hib) کی ویکسین: آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے

1. ویکسین کیوں لگوائیں؟

Hib کی ویکسین ہیمو فیلز انفلوئنزا ٹائپ بی (Hib) بیماری سے بچا سکتی ہے۔

ہیمو فیلز انفلوئنزا قسم b بہت سے مختلف قسم کے انفیکشنز کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ انفیکشنز عام طور پر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو متاثر کرتے ہیں لیکن بعض دائمی امراض والے بالغوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ Hib بیکٹیریا ہلکی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں، جیسے کان میں انفیکشن یا برونگائٹس، یا وہ شدید بیماری کا سبب بن سکتے ہیں، جیسے خون کے انفیکشنز۔ شدید Hib انفیکشن، جسے "ناگوار Hib بیماری" بھی کہا جاتا ہے، کے لیے ہسپتال میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات موت بھی ہو سکتی ہے۔

Hib ویکسین سے پہلے، ریاستہائے متحدہ امریکہ میں 5 سال سے کم عمر بچوں میں بیکٹیریل مینجائٹس کی سب سے بڑی وجہ Hib بیماری تھی۔ مینجائٹس (گردن توڑ بخار) دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کی پرت کا انفیکشن ہے۔ یہ دماغ کے نقصان اور بھرے پن کا باعث بن سکتا ہے۔

Hib انفیکشن ذیل کا سبب بھی بن سکتا ہے:

- نمونیا
- گلے میں شدید سوجن جس سے سانس لینا مشکل ہوتا ہے
- خون، جوڑوں، ہڈیوں اور دل کے پردے کے انفیکشنز
- موت

2. Hib کی ویکسین

Hib کی ویکسین عام طور پر 3 یا 4 خوراکیوں میں دی جاتی ہے (برائنڈ پر منحصر)۔

شیر خوار بچوں کو عام طور پر 2 ماہ کی عمر میں Hib کی ویکسین کی پہلی خوراک ملے گی اور عام طور پر یہ سلسلہ 12-15 ماہ کی عمر میں مکمل ہو جائے گا۔

12 ماہ اور 5 سال کی عمر کے بچے جن کو پہلے مکمل طور پر Hib کے خلاف ویکسین نہیں لگائی گئی ہو، انہیں Hib ویکسین کی 1 یا زیادہ خوراک کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

5 سال سے زیادہ عمر کے بچوں اور بڑوں کو عام طور پر Hib کی ویکسین نہیں لگائی جاتی، لیکن اس کی سفارش بڑے بچوں یا بالغوں کے لیے کی جا سکتی ہے جن کی تلی کو نقصان پہنچا ہے یا تلی نکال دی گئی ہے، بشمول سکیل سیل کی بیماری والے افراد، تلی کو ہٹانے کے لیے سرجری سے پہلے، یا بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بعد۔ ایچ آئی وی والے 5 سے 18 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے بھی Hib کی ویکسین کی سفارش کی جا سکتی ہے۔

Hib کی ویکسین ایک تنہا ویکسین کے طور پر دی جا سکتی ہے، یا ایک مجموعہ ویکسین کے حصے کے طور پر (ایک قسم کی ویکسین جو ایک سے زیادہ ویکسین کو ایک ساتھ ملاتی ہے)۔

Hib ویکسین دیگر ویکسین کے ساتھ ایک ہی وقت میں دی جا سکتی ہے۔

3. اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے بات کریں

اپنے ویکسین فراہم کنندہ کو بتائیں اگر جو شخص ویکسین لے رہا ہے اسے:

• Hib کی ویکسین کی پچھلی خوراک کے بعد الرجی زار رد عمل ہوا ہے، یا کوئی شدید، جان لیوا الرجیا ہوں

کچھ معاملات میں، آپ کا نگہداشت صحت فراہم کنندہ مستقبل کی کسی ملاقات تک Hib کی ویکسینیشن کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔

نزلے جیسی معمولی بیماریوں میں مبتلا افراد کو، ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ جو لوگ تھوڑے بہت یا شدید بیمار ہیں انہیں عام طور پر Hib کی ویکسین لگوانے سے پہلے صحت یاب ہونے تک انتظار کرنا چاہیے۔

آپ کا نگہداشت صحت فراہم کنندہ آپ کو مزید معلومات دے سکتا ہے۔



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

4. ویکسین کے ردعمل کے خطرات

• Hib ویکسینیشن کے بعد ٹیکہ لگنے کی جگہ پر لالی، گرمی، اور سوجن ہو سکتی ہے اور بخار ہو سکتا ہے۔

لوگ بعض اوقات طبی طریقہ کار، بشمول ویکسینیشن کے بعد بیہوش ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو چکر آ رہا ہے یا آپ کی بصارت میں تبدیلی آئی ہو یا کانوں میں گھنٹیاں بج رہی ہوں تو اپنے فراہم کنندہ کو بتائیں۔

کسی بھی دوا کی طرح، ویکسین کے شدید الرجی زار ردعمل، دیگر سنگین چوٹ، یا موت کا باعث بننے کا بہت کم امکان ہوتا ہے۔

5. اگر کوئی سنگین مسئلہ ہو تو کیا ہو گا؟

ویکسین شدہ شخص کے کلینک سے نکلنے کے بعد الرجی زار ردعمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو شدید الرجی زار ردعمل کی علامات نظر آئیں (چھپاکی، چہرے اور گلے میں سوجن، سانس لینے میں دشواری، دل کی تیز دھڑکن، چکر آنا، یا کمزوری)، تو 1-9 کو کال کریں اور اس شخص کو قریبی ہسپتال لے جائیں۔

دیگر ایسی علامات کے لیے، جو آپ کے لیے تشویش کا باعث ہوں، اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ کو کال کریں۔

ویکسین کے ناموافق واقعہ کے رپورٹنگ سسٹم

(Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS)

کو منفی ردعمل کی اطلاع دی جانی چاہیے۔ آپ کا نگہداشت صحت فراہم کنندہ عام طور پر یہ رپورٹ درج کرائے گا، یا آپ خود بھی کرا سکتے ہیں۔ VAERS ویب سائٹ www.vaers.hhs.gov ملاحظہ کریں یا 1-800-822-7967 پر کال کریں۔ VAERS صرف ردعمل کی اطلاع دینے کے لیے ہے، اور VAERS کے عملے کے اراکین طبی مشورہ نہیں دیتے ہیں۔

6. نیشنل ویکسین انجری کمپنسیشن پروگرام

نیشنل ویکسین انجری کمپنسیشن پروگرام

(National Vaccine Injury Compensation Program, VICP)

ایک وفاقی پروگرام ہے جو ان لوگوں کو معاوضہ دینے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا جنہیں کچھ ویکسینوں سے ضرر پہنچا تھا۔ ویکسینیشن کی وجہ سے مبینہ چوٹ یا موت کے حوالے سے دعوے دائر کرنے کے لیے ایک وقت کی حد ہے، جو دو سال تک مختصر ہو سکتی ہے۔ پروگرام کے بارے میں جاننے اور دعویٰ دائر کرنے کے بارے میں VICP کی ویب سائٹ

www.hrsa.gov/vaccinecompensation ملاحظہ فرمائیں یا 1-800-338-2382 پر کال کریں۔

7. میں مزید کیسے جان سکتا ہوں؟

- اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے پوچھیں۔
- اپنے مقامی یا ریاستی محکمہ صحت کو کال کریں۔
- ویکسین پیکیج کی پرچی اور اضافی معلومات کے لیے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (Food and Drug Administration, FDA) کی ویب سائٹ یہاں ملاحظہ کریں

www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines

- بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) سے رابطہ کریں:

کال کریں 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) پر یا

CDC کی ویب سائٹ www.cdc.gov/vaccines ملاحظہ کریں۔

